

## Kalkės Neoanticid Erbslöh



Neoanticid yra specialiai atrinktos kalkės, skirtos rūgšties sumažinimui vyne.

**3,32 € su PVM**

Prekės kodas: 3.202-556.99

**Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

Pakuotė: 5 kg, 25 kg, 1 kg, 100 g, 20 kg

Sudėtyje:: iš nusodinto, chemiškai gryno kalcio karbonato (E170)

Rekomenduojamos rūšys:: J. serbentų, rabarbarų vynui

Pritaikymas:: Rūgšties sumažinimas (misoje / vynuogių sultyse ir jauname vyne), obuolių rūgšties ir vyno rūgšties tuo pačiu metu.

Aromatas: įtakos neturi

Dozavimas:: sumažinti 1 g rūgšties/ 1 litre sulčių, reikalinga naudoti 67 g Neoanticid 100 l gėrimo.

### **Prekės aprašymas:**

Neoanticid yra specialiai atrinktos kalkės, skirtos rūgšties sumažinimui. Preparatas yra sudarytas iš nusodinto, chemiškai gryno kalcio karbonato (E170). Skirtas maistiniam naudojimui (riboto naudojimo): taikant produktą privaloma laikytis naudojimo instrukcijos.

Leistinas pagal, šiuo metu galiojančius, įstatymus ir teisės aktus. Grynumas ir kokybė įrodyti specializuotose laboratorijose.

### **Pritaikymas**

Rūgšties sumažinimas (misoje / vynuogių sultyse ir jauname vyne), obuolių rūgšties ir vyno rūgšties tuo pačiu metu.

### **Prekės ir poveikis**

Rūgšties sumažinimas, naudojant Neoanticid, yra pagrįstas tuo, kad dalinis kiekis, kuris turi būti apskaičiuotas bus visiškai

nurūgštintas. Po to, kai kristalinės nuosėdos yra atskirtos, šis dalinis kiekis yra vėl sumaišomas su nesumažinto rūgštingumo gėrimu. Tokiu būdu, obuolių rūgštis yra pašalinama, išsaugant vyno rūgšties kiekį. Šis poveikis ypač svarbus harmoningam skonio įvertinimui, norint užtikrinti gerai subalansuotą rūgštingumą.

### **Dozavimas**

Siekiant pašalinti 1 % arba 1 g rūgšties/ 1 litre sulčių, reikalinga naudoti 67 g Neoantacid 100 l gėrimo. Bendras Neoantacid kiekis yra maišomas su nedideliu kiekiu misos / vyno ir, tik tada, gautoji masė dedama į naudojamą rezervuarą, kaip pirmasis komponentas. Kai nustatomas dalinis misos arba vyno kiekis, kuris bus naudojamas šiame procese, leidžiama pradėti procesą.

Norint nustatyti reikalingą kiekį Neoantacid ir dalinį misos ar vyno kiekį, naudojama Neoantacid rūgštingumo sumažinimo lentelė. Po trumpo (5-15 minučių) maišymo, nusodintos nuosėdos gali būti atskiriamos filtracijos būdu (geriausiai kizelgūro filtru). Po to, reikia sumaišyti likusį kiekį su rūgštingumo mažinimo doze.

### **Nuotraukų galerija:**

