

Granucol® FA Erbslöh



Augalinės kilmės aktyvuotos anglies granulės, Taninų ir polifenolių kiekiui mažinti bei intensyviai spalvai naikinti.

18,26 € su PVM

Prekės kodas: 3.202-578.99

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Pakuotė: 1 kg, 10 kg

Paskirtis: Taninų ir polifenolių kiekiui mažinti bei intensyviai spalvai naikinti.

Sudėtyje: augalinės kilmės aktyvuotos anglies granulės

Dozavimas: Turėtų būti atliekami bandymai, kad nustatyti, optimalią naudojimo dozę

Ipakavimas: 1kg arba 10kg

Naudotinas kartu su: Želatina ir Silicio Zolis

Prekės aprašymas:

Granucol® yra augalinės kilmės aktyvuotos anglies granulės. Granucol® preparatas paruoštas iš aktyvuotos anglies miltelių su atitinkamai kintančiu vidiniu paviršiumi, kas ir lemia specifinį adsorbcijos tūrį. Produktas pagamintas taip, kad garantuotų puikų atskirų granuliu pasiskirstymą.

Produktas leistinas pagal šiuo metu galiojančius Europos Sąjungos įstatymus ir teisės aktus. Grynumas ir kokybė įrodyti specializuotose laboratorijose.

Pritaikymas

Priklausoma nuo poreikio, Granucol® yra naudojami Taninų ir polifenolių kiekiui mažinti bei intensyviai spalvai naikinti.

Prekės ir poveikis

Granucol® naudojimas pašalina nepageidaujamo dažiklio selektyvią adsorbciją, patobulina skonį. Anglis svarbi absorbcijai užtikrinti, taip paspartinamas procesas, išsaugomos gėrimo gerosios medžiagos, mažinimas taninų ar dažančiųjų medžiagų

kiekis. Granucol® veikia ne tik greitai, bet ir labai efektyviai. Paprastai, į gėrimą Granucol® dedamas kaip pirmasis komponentas, o vėliau maišomas su kitais stabilizatoriais. Želatino ir silicio zolio naudojimas pagerina nusėdimo ir filtracijos procesus.

Dozavimas

Granucol® tiesiogiai dedamas į misos, vyno, sulčių ar kitus gėrimus, t.y. jo nereikia ištirpinti prieš naudojimą. Įdėjus, reikia keletą minučių intensyviai maišyti. Vėliau dar kartą išmaišyti 2 arba 3 kartus trumpais intervalais. Adsorbicija yra pilnai baigta per vieną dieną, o dažniausiai jau po kelių valandų. Aktyvuotos anglies dalelės po naudojimo turėtų būti iškart atskirtos. Turėtų būti atliekami bandymai, kad nustatyti, optimalią naudojimo dozę. Rekomenduojamas dozavimas yra orientacinės vertės:

1. Vynuogių misos, saldaus vyno (nefermentuotos / iš dalies fermentuotos vynuogių sultys / būtina pasaldinti) ir vaisių sulčių apdorojimas:

b) Granucol® FA dozuojamas 10-50 g / 100 l. Šalina skirtingo skaidrumo problemas ir veda prie gero skaidrumo išgavimo bei skonio sušvelninimo ypač tada, kai apdorojami intensyvia spalva pasižymintys gėrimai ar gėrimai su dideliu taninų kiekiu. Taninų kiekis yra atsargiai ir veiksmingai sumažinamas, o šis apdorojimas derinamas kartu su Granucol® FA ir Gerbinol® Super. Pirmiausia įdedama aktyvioji anglis, vėliau Gerbinol® Super, kuris laikomas maždaug 1-2 valandas.

Remiantis EC reglamentu Nr. 606/2009 aktyvintosios anglies naudojimas leidžiamas mentalui, misai, ir jaunam baltųjų ir raudonųjų vynuogių vynu. Be to, aktyvuotos anglies naudojimas yra patvirtintas baltųjų vynuogių vynu. Apskritai, maksimali aktyvuota anglies dozė leidžiama 100 g /100 l (kg).

2. Spirituotų gėrimų ir brendžių apdorojimas:

Reikiama dozė spalvos šalinimui priylgsta 50-100 g Granucol® FA/100 l. Procesas turi būti atliekamas, kai gėrimo stiprumo laipsnis yra didesnis nei 55%.

Nuotraukų galerija:

