


Ercobin Erbslöh, e.Ascorbic vitamino C produktas



Ercobin apsaugo nuo oksidacijos, stabilizuodamas skonį ir aromatą. Galima naudoti profilaktiškai, norint išlaikyti ilgai išliekantį, nepakitęs skonį.

25,05 € su PVM

Prekės kodas: 3.202-586.99

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Pakuotė: 1 kg, 100 g

Talpa: 1kg

Sudėtyje:: L(+) askorbo rūgštis E300

Pritaikymas:: Ercobin apsaugo nuo oksidacijos, stabilizuodamas skonį ir aromatą

Dozavimas:: 10-15 g į 100 litrų

Prekės aprašymas:

Ercobin yra chemiškai išgryninto vitamino C produktas, specialiai atrinktas ir pritaikytas gėrimų gamyboje. Cheminis pavadinimas: L(+) askorbo rūgštis E300. Tinkamas naudoti maisto produktams (riboto naudojimo).

Preparatas leistinas pagal šiuo metu galiojančias naudojimo taisykles ir reglamentus. Grynumas ir kokybė įrodyti specializuotose laboratorijose.

Pritaikymas

Ercobin apsaugo nuo oksidacijos, stabilizuodamas skonį ir aromatą. Galima naudoti profilaktiškai, norint išlaikyti ilgai išliekantį, nepakitęs skonį.

Prekės ir poveikis

Ercobin yra aukštos kokybės, antioksidacinė priemonė, net jei vyne ir reikalingas SO₂, aromatas yra daug geriau išsaugomas, nes Ercobin paskatina redukcinių aktyvumą. Ercobin taip pat sustiprina vynui būdingą skonį.

Ercobin poveikis:

- Vynas išpilstytuose buteliuose ilgiau išlaiko jam specifinį aromatą, kas lemia vyno kokybę;
- Ilgai sandėliuojamiems, putojantiems vynams suteikia stipresnį aromatą, šviežumą ir vaisių skonį. Ercobin naudojimas yra ypač naudingas mažiau rūgšties vynams (priklausomai nuo vynuogių veislės, poveikis gali pasireikšti ne iškart);
- Veikia kaip prevencinė priemonė prieš netipiską skonio pakitimą, senėjimą: indolo acto rūgštį (vieno iš auksinų), kuri aptinkama vynuogėse, apsauganti nuo vytimo (pvz formilamino-fenil-3-oksido propiono rūgštis), skyla į 2-amino acetofenoną, kas sukelia skonio pakitimus vyne. Atsižvelgiant į daugelio mokslininkų pranešimus ir publikacijas, Ercobin (vitaminas C), labai gerai apsaugo nuo šių nepageidaujamų reakcijų. Ercobin dozuojamas 10-15 g į 100 litrų ir turėtų būti įdėtas kuo greičiau po pirmojo sulfitinimo. Jei gautas rezultatas netenkina, dozė gali būti padidinta. Europos Sąjungoje teisiškai leidžiamas maksimalus askorbo rūgšties kiekis vyne neturi viršyti 250 mg litre, kuris atitinka iki 25 g, 100 litrų.

Taikymas

Atsižvelgiant į vyndarių teises - teisiškai pripažintas didžiausias Ercobin produkto kiekis Europos Sąjungoje gali siekti iki 250 mg/l. Dažnai naudojamas 10g/100 l kiekis pakankamai padeda išsaugoti aromatą ir apsaugoti nuo oksidacijos. Naudojamo Ercobin kiekis yra geriausiai nustatomas atliekant pirminius bandymus. Pradžioje ištirpinamas, bent jau, 20-kartų didesniame vyno kiekyje ir kruopščiai sumaišomas, kol tolygiai paskirsto. Jei Ercobin naudojamas netipinio pobūdžio brandinimui, produkto turi būti įdėta netrukus po pirmojo sulfitinimo. Priklausomai nuo siekiamo išgauti skonio intensyvumo, dozė gali būti koreguojama. Ercobin tampa veiksmingu antioksiduojančiu faktoriumi tik tada, kai laisvojo SO₂ kiekis vyne yra pakankamas. Štai kodėl, laisvojo SO₂-kiekis vyne turėtų būti stabilus ir siekti bent 30 mg litre.

Nuotraukų galerija:

